

POINTS D'ATTENTION

L'injection de fer ou injectafer est contre-indiquée durant le premier trimestre de la grossesse. Informez le personnel soignant si vous êtes enceinte ou risquez de l'être.

Informez également le personnel soignant si :

- › Vous recevez un traitement pour une infection.
- › Vous avez eu des réactions sévères suite à une perfusion de fer ou un autre médicament.
- › Vous avez de l'eczéma sévère, une maladie respiratoire ou cardiaque sévère, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde ou une maladie inflammatoire chronique de l'intestin.

Les comprimés à base de fer sont à stopper 5 jours avant votre injection de fer et à ne pas reprendre après la dernière injection (sauf contre-avis médical).

Vous avez une question ?

L'équipe soignante se tient à votre disposition pour y répondre !

Vous pouvez contacter l'hôpital de jour médical **24h/24, 7 jours/7.**



7B



064/27.75.24



hopitaldejourmedical@chu-tivoli.be

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière



064/27.61.11



information@chu-tivoli.be



www.chu-tivoli.be



CHU Tivoli

ULB

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli
Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière
Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99
www.chu-tivoli.be

E.R.: CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Référence : COMMEDINT002



**Informations destinées
aux patients devant
recevoir une injection
de fer ou injectafer en
intra-veineux**



DÉROULEMENT ET DURÉE DE LA PERFUSION



Prévoyez généralement 2 heures pour votre injection de fer en hôpital de jour médical.

Vous serez surveillé avant, pendant et durant 30 minutes après l'arrêt de la perfusion.

Si vous ressentez une gêne, une sensibilité, une douleur, un inconfort, une sensation de brûlure, des fourmillements, des picotements ou des démangeaisons durant la perfusion, prévenez immédiatement le personnel soignant.

Si une seconde perfusion de fer est indiquée, elle doit être espacée de 5 à 7 jours de la première dose. 2 rendez-vous en hôpital de jour médical seront donc nécessaires.



EFFETS SECONDAIRES

La majorité des patients ne rencontrent aucun effet indésirable. Néanmoins, peuvent survenir rapidement : maux de tête, vertiges, nausées, bouffées de chaleur ou réactions au point de perfusion.

De quelques heures à 4 jours après la perfusion peuvent également survenir : maux de tête, fièvre, douleurs articulaires et/ou musculaires. Pour contrer ces effets, 1 gr de paracétamol ou de dafalgan peut être pris au besoin. Dans de rares cas, des taches cutanées peuvent apparaître.



RETOUR AU DOMICILE

Un membre du personnel soignant vous contactera le lendemain (ou le lundi si injection le vendredi) pour assurer le suivi. Celui-ci sera consigné dans votre dossier.

Vous trouverez le numéro de contact de l'unité au dos du document. Celle-ci est disponible 24h/24, 7 jours/7. N'hésitez pas à appeler en cas d'inquiétude ou de question relative au suivi de votre injection de fer.

COÛT €

La perfusion de fer est totalement remboursée selon des critères bien définis.

Si les critères de remboursement ne sont pas remplis, 1 flacon de fer de 500 mg coûte 74€, mais 2 flacons sont injectés lors de chaque perfusion. Une cure de 2 injections coûte donc 296€.

Votre médecin pourra vous fournir plus d'informations sur les critères de remboursement.

LE TRAITEMENT A-T-IL FONCTIONNÉ ?



Il est recommandé de réaliser une analyse de sang dans les 4 semaines qui suivent l'injection. Votre médecin pourra vous fournir plus d'informations à ce sujet.

