Vous souhaitez annuler votre rendez-vous ?

Par SMS : en répondant au sms avec le code d'annulation.

Par téléphone : en téléphonant au secrétariat 064/27.61.11.

CONTACTS

CHU Tivoli

: Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

: 064/27.61.11

: www.chu-tivoli.be

Suivez l'actualité du CHU Tivoli sur nos réseaux sociaux :

CHU Tivoli

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli
Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière
Tél. : 064/27 61 11 • www.chu-tivoli.be

Référence : COMMEDNU005

Scintigraphie cardiaque à l'effort

Médecine nucléaire

But

› **Observation :** observer la perfusion du muscle cardiaque à l'effort (cf. fiche informative en cardiologie) ou au repos (minimum 2 jours après l'effort).

› **Évaluation :** évaluer la contraction du cœur.

Accueil

Localisation : présentez-vous au secrétariat de Cardiologie (Aile A - Niveau 2).

APRES l'examen à l'effort : allez directement au secrétariat de Médecine nucléaire au 3B (3ème étage - Aile B), à gauche en sortant des ascenseurs.

Munissez-vous de votre :

› Carte d'identité
› Demande d'examen de votre médecin

Instructions générales

Grossesse : l'examen est contre-indiqué chez les femmes enceintes.

Allaitement : si vous allaitez, signalez-le car des précautions doivent être prises.

Consigne : ne prenez pas vos bijoux et objets de valeur.

Préparation de l'examen

Médicaments : vous pouvez prendre vos médicaments habituels sauf contre ordre du cardiologue.

Alimentation : vous pouvez déjeuner. Merci de prendre avec vous un morceau de chocolat (fromage gras si le patient est diabétique).

Isotope utilisé

Myoview Tc99m

Déroulement de l'examen

• **Phase 1 :** cathéter mis en place pour facilité l'injection :

› soit examen d'effort sur vélo

› soit injection d'adénosine

• **Phase 2 :** vous irez marcher et pendant ce temps vous mangerez le chocolat (ou le fromage gras).

• **Phase 3 :** l'examen dure 30min.

Après l'examen

Reprise des activités : vous pouvez reprendre vos activités habituelles.

Hydratation : vous devez boire beaucoup pour uriner souvent afin d'éliminer la radioactivité dans le corps.

Précautions (jusqu'à 4h après l'injection) : évitez les contacts rapprochés et prolongés avec les bébés, les jeunes enfants (moins de 3 ans) et les femmes enceintes.