Vous souhaitez annuler votre rendez-vous ?

Par SMS : en répondant au sms avec le code d'annulation.

Par téléphone : en téléphonant au secrétariat 064/27.61.11.

CONTACTS

CHU Tivoli

: Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

: 064/27.61.11

: www.chu-tivoli.be

Suivez l'actualité du CHU Tivoli
sur nos réseaux sociaux :

CHU Tivoli

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli
Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière
Tél. : 064/27 61 11 • www.chu-tivoli.be

Référence : COMMEDNU006

Scintigraphie cérébrale

Médecine nucléaire

Indications

› **Maladies neurodégénératives :** bilan de démence, troubles cognitifs.

› **Bilan d'atteinte vasculaire (AVC)**

Accueil

Localisation : présentez-vous directement au secrétariat de Médecine nucléaire au 3B (3ème étage - Aile B), à gauche en sortant des ascenseurs.

Munissez-vous de votre :

› Carte d'identité
› Demande d'examen de votre médecin

Instructions générales

Grossesse : l'examen est contre-indiqué chez les femmes enceintes.

Allaitement : si vous allaitez, signalez-le car des précautions doivent être prises.

Horaire : l'examen nécessite de venir le matin une demi-heure avant l'examen.

Durée : l'examen dure 1/2 h.

Préparation de l'examen

Aucune préparation n'est nécessaire.

Médicaments : vous pouvez prendre vos médicaments habituels. Vous ne devez **PAS** être à jeun

Isotope utilisé

HMPAO-Tc99m

Déroulement de l'examen (Tomoscintigraphie cérébrale)

L'injection : nous vous injectons un traceur radioactif dans la veine. Le traceur se dirige vers certaines zones du cerveau qui sont actives.

L'imagerie : les rayonnements émis par le traceur sont détectés par une gamma caméra et permettent de produire des images du cerveau en trois dimensions.

Après l'examen

Reprise des activités : vous pouvez reprendre vos activités habituelles.

Hydratation : vous devez boire beaucoup pour uriner souvent afin d'éliminer la radioactivité dans le corps.

Précautions (jusqu'à 4h après l'injection) : évitez les contacts rapprochés et prolongés avec les bébés, les jeunes enfants (moins de 3 ans) et les femmes enceintes.