

## ALLERGIE

Une prémédication vous sera prescrite afin de prévenir les réactions d'hypersensibilité. Vous prendrez une gélule de dexaméthasone 20 mg la veille au soir ainsi que le matin du traitement.

## SENSIBILITÉ BUCCALE

Nous vous conseillons d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Des bains de bouche vous seront prescrits et débuteront dès le début du traitement.

## NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE

Sensation de fourmillements, engourdissements et picotements des extrémités possibles au fur et à mesure des cures.

## ANÉMIE

Diminution des globules rouges pouvant se manifester par un essoufflement ou une majoration de la fatigue.

## SYNDROME PSEUDO GRIPPAL

Dans les 72h qui suivent l'administration du traitement, des courbatures associées à de la fièvre peuvent survenir. Elles seront soulagées par la prise de paracétamol (maximum 4x 1g/24h).

## CONSEILS

Prévenez toujours le médecin si vous présentez les signes suivants :

- › Nausées et vomissements persistants.
- › Diarrhées qui persistent plus de 48h.
- › Eruptions cutanées.
- › Température supérieure à 38° ou gros frisson.
- › Apparition de bleus ou des taches rouges sur le corps.
- › Saignement anormal.

Nous vous recommandons de :

- › Boire beaucoup d'eau.
- › Eviter l'exposition au soleil.
- › Maintenir une activité physique.

## CONTACTS

Votre oncologue : 064/27 63 31

Infirmières :

- › Hôpital de jour (CRG) : 064/27 63 31
- › Infirmière coordinatrice : 064/27 77 57

ULB

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli  
Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière  
Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99  
www.chu-tivoli.be

Référence : COMONCO002



## Information destinée aux patients sous chimiothérapie de type carbo-taxol



## EN PRATIQUE


Avant chaque traitement, vous serez vu par votre médecin. Cette consultation a pour but de vérifier la tolérance au traitement précédent et l'absence de contre indication à la réalisation du suivant. Une prise de sang sera systématiquement réalisée la veille du traitement ou le jour même. Dans ce cas, vous devez vous présenter une heure à l'avance au laboratoire. Il ne faut pas être à jeun pour faire la prise de sang.

Vous serez ensuite pris en charge par une infirmière qui réalisera le traitement. Celui-ci s'administre par perfusion intraveineuse. Les différentes étapes vous seront expliquées au fur et à mesure.

## SCHÉMA DE TRAITEMENT

### MÉDICAMENTS :

- › Carboplatine®
- › Taxol®



## DÉROULEMENT

### NOMBRE DE SÉANCES :

3 à 6 selon la prescription de votre oncologue. Ce traitement est adapté à votre maladie et a été validé après discussion en réunion de concertation multidisciplinaire.

### DÉLAI THÉORIQUE ENTRE DEUX CURES :

21 jours.

### OÙ ?

Le traitement se déroule à l'hôpital de jour situé au centre René Goffin. Il s'administre par perfusion intraveineuse.

### DURÉE :

L'administration du traitement sera de 6 heures environ.

## EFFETS SECONDAIRES

Ce document reprend la liste des effets indésirables les plus fréquents. Ces effets secondaires sont possibles mais pas systématiques.

N'hésitez pas à communiquer tout problème rencontré en cours de traitement à l'infirmières ou au médecin.

Nous restons à votre écoute.

## SYMPTÔMES

### NAUSÉES/VOMISSEMENTS

Un traitement anti-nauséux vous sera systématiquement administré au début de la cure et sera complété d'un traitement à domicile. Votre oncologue vous prescrira des médicaments à prendre suivant les modalités qu'il précisera. Il est important de prendre ces médicaments même en l'absence de symptômes.

### NOS CONSEILS

- › Fractionnez vos repas.
- › Préférez les plats froids ou tièdes aux plats chauds.
- › Evitez les odeurs fortes (parfum, tabac, ...)
- › Evitez les aliments gras, épicés et frits.

### ALOPÉCIE

La perte des cheveux apparaît 2 à 3 semaines après le premier traitement. Celle-ci est temporaire et réversible à l'arrêt de celui-ci. Une conseillère est à votre disposition afin de vous renseigner sur les alternatives possibles.

### NEUTROPÉNIE

Une chute des globules blancs peut apparaître pendant le traitement, ce qui peut entraîner un risque infectieux. Il est important de surveiller votre température, Si cette dernière est supérieure à 38°, présentez vous sans tarder aux urgences.

La neutropénie peut nécessiter la prise d'antibiotiques et dans certains cas une hospitalisation.