

Effets secondaires possibles

Nausées - Vomissements:

Peuvent se présenter durant les 72 premières heures du traitement.

Des médicaments vont vous être prescrits (Zofran[®], Motilium[®]) et doivent être pris selon prescription médicale.

Conseils:

- => Fractionnez les repas (l'estomac vide augmente la sensation de nausée)
- => Ecoutez vos envies (ne mangez pas des aliments que vous aimez d'habitude mais qui pourraient vous écoeurer.)
- => Préférez les plats froids ou tièdes aux plats chauds.
- => En cas de nausées, évitez la position allongée.

Perte de cheveux:

Assez fréquente. Elle apparaît à +/- 2-3 semaines après le 1er traitement. Elle est complètement réversible à l'arrêt du traitement.

- => Evitez les sèche-cheveux, brushing, lissage.
- => Utilisez un shampoing doux ou pour bébé.
- => Coupez les cheveux courts et prenez rendez-vous avec un conseiller capillaire.

Diminutions des plaquettes:

Favorisant des saignements comme des saignements de gencives (au brossage de dents) ou de nez.

- => Utilisez une brosse à dent à poils souples.

Si vous constatez l'apparition spontanée de petites taches rouges sur les jambes ou des bleus

- => Appelez votre médecin traitant

Neutropénie, infection:

Surveillez régulièrement votre température. Si celle-ci est supérieure à 38°C. contactez votre oncologue ou rendez-vous aux urgences.

La chimiothérapie peut diminuer les défenses immunitaires et donc accroître la sensibilité aux infections.

Atteinte rénale:

Le cisplatine[®] peut provoquer une toxicité rénale. Pour favoriser l'élimination de ce traitement, il faudra augmenter votre consommation d'eau avant la chimio et pendant les 48 premières heures du traitement.

Fatigue:

Normale après ce type de traitement. Il faudra adapter vos activités et vous reposer de temps en temps. Il est conseillé de ne pas rester inactif afin de ne pas accroître la fatigue.

Aphtes:

Ils peuvent apparaître quelques jours après la chimiothérapie.

Conseil: faire régulièrement des bains de bouche (Corsodyl[®], à la nystatine).

Si aggravation, consultez votre médecin.

Atteinte de la sensibilité des extrémités:

Cette chimiothérapie peut entraîner des fourmillements ou des pertes de sensation au niveau des mains et/ou des pieds.

Atteinte de l'audition:

Bourdonnement ou diminution de l'audition.



Chimiothérapie

Fascicule destiné aux patients
sous CISPLATINE[®] et EPOSIN[®]

Schéma de traitement

Médicaments:

- => Cisplatine®
- => Eposin®

Le traitement consistera à l'administration de plusieurs produits se présentant sous forme de poches à perfusions que l'infirmière viendra brancher pendant la durée du traitement.

Informations pratiques concernant le traitement:


Où? Dans l'unité d'oncologie 7A

Durée d'hospitalisation: 3 jours


Nombre de séances: 6

intervalle entre chaque traitement: 3 semaines


J1



J2



J3



=> Une tourie vous sera donnée afin de récolter vos urines afin de suivre votre diurèse pendant la chimio.

=> Votre poids sera pris à l'admission et le matin suivant.

Ces deux mesures permettent de voir si vous avez bien éliminé les liquides reçus pendant la chimiothérapie.

=> Un diurétique vous sera administré si le médecin estime que vous n'aurez pas éliminé assez.

Prévenir le médecin si:

- => Nausées, vomissements persistants
- => Aphtes très douloureux
- => Diarrhées de plus de 5 jours
- => Température supérieure à 38°
- => Apparition de bleus ou de taches rouges sur le corps
- => Saignement anormal
- => Atteinte de l'audition

Contacts

Votre oncologue: 064/27.61.11

Infirmières:

Hospitalisation (7A): 064/27.65.88

Hôpital de jour (CRG): 064/27.73.31