

Nausées– Vomissements:

Si les médicaments (Zofran 2x1co/j) déjà prescrits ne suffisent pas . Du Motilium®, Litican®, pourra être prescrit si nécessaire.

Perte des cheveux:

Peut survenir chez certaines personnes et est rarement complète. Elle apparaît à +/- 3-4 semaines après le 1er traitement.
Elle est complètement réversible à l'arrêt du traitement.

Aphtes:

Ils peuvent apparaître quelques jours après la chimiothérapie.

Conseil: faire régulièrement des bains de bouche (Corsodyl®, à la nystatine).

Si aggravation, consultez votre médecin.

Diarrhées:

Si des diarrhées importantes se présentent; vous pouvez prendre de l'Immodium® 2 gelules puis 1 gelule à chaque selle liquide.

Fatigue:

Normal après ce type de traitement. Il faudra adapter vos activités et se reposer de temps en temps. Il est conseillé de ne pas rester inactif afin de ne pas accroître la fatigue.

Neutropénie, infection:

Surveillez régulièrement votre température. Si celle-ci est supérieure à 38°C, contactez votre oncologue ou rendez vous aux urgences.

La chimiothérapie peut diminuer les défenses immunitaires et donc accroître la sensibilité aux infections.

Polyneuropathie:

Des picotements dans les doigts et la gorges peuvent apparaître au contact avec le froid.

Évitez l'eau froide, le frigo, protégez vous pendant l'hiver (gants, écharpe).

Affections de la peau:


La chimio peut provoquer un assèchement de la peau.

Angine de poitrine:

Très rare; si vous ressentez des douleurs dans la poitrine, un électrocardiogramme doit être effectué, rendez vous au service des urgences.

Chimiothérapie

Informations destinées aux patients sous chimiothérapie de type FOLFOX



SCHEMA DE TRAITEMENT


Médicaments:

- => Eloxatine®
- => Elvorine®
- => Fluroblastine® (5FU)

Le traitement consistera en l'administration de plusieurs produits se présentant sous forme de poches à perfusion que l'infirmière viendra brancher pendant la durée du traitement.

Prévenir le médecin si :

- => Température supérieure à 38°
- => Douleur dans la poitrine
- => Nausées, vomissements importants
- => Aphtes très douloureux
- => Diarrhées de plus de 5 jours



A l'hôpital (CRG)

Informations pratiques concernant le traitement:

Où? A l'hôpital de jour (Centre René Goffin)

Durée d'hospitalisation 3h

Intervalle entre chaque traitement 14j

A domicile



Contacts:

Secrétariat Hôpital de jour (CRG):
064/27.63.31

Infirmière coordinatrice:
064/27.49.33

Hospitalisation (7A):
064/27.65.88