

Effets indésirables éventuels

Tous les médicaments peuvent induire des effets indésirables, mais ceux-ci ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- » Rétention de liquide dans vos jambes ou vos pieds (œdème).
- » Hypertension
- » Infection des voies urinaires
- » Faible taux de potassium dans votre sang
- » Diarrhée
- » Taux élevé de graisses dans votre sang
- » Troubles du rythme cardiaque
- » ...

Informez le médecin ou l'infirmière coordinatrice en cas de diarrhée pendant l'utilisation du médicament car un déficit en potassium risque alors d'apparaître.

Évitez de consommer des aliments très salés.

La consommation de bananes, de tomates ou de légumes secs peut vous aider à maintenir votre taux de potassium à un bon niveau.

Contact



Infirmière coordinatrice :
064/27.77.57

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière



064/27.61.11



information@chu-tivoli.be



CHU Tivoli



www.chu-tivoli.be

ULB

REF : COMONCO017

Images/illustrations : Freepik, Pexels

E.R. : CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34

- 7100 La Louvière



Traitement par Abiratérone

Service d' Oncologie



L'Abiratérone

Le traitement par Abiratérone a pour objectif de bloquer la production d'androgènes (testostérone). Il agit en complément des autres inhibiteurs d'hormones que votre médecin vous a prescrits antérieurement (piqûres).

Il est toujours utilisé en même temps que la Prednisolone qui a pour objectif de diminuer les effets indésirables possibles de ce médicament (comme une tension artérielle élevée, un faible taux de potassium dans le sang ou un gonflement des jambes).



Comment prendre mon traitement ?

L'Abiraterone doit être pris chaque jour :
2 comprimés de 500 mg à prendre en une fois avec de l'eau.



Ne rien manger **2 heures avant** la prise des comprimés.



Ne rien manger **une heure après** la prise des comprimés.

Exemples possibles :

» Prenez les deux comprimés au réveil le matin et déjeunez une heure après.

Ou

» Déjeunez le matin dès votre réveil (8h) et prenez les deux comprimés 2 heures plus tard (10h) et ensuite attendez une heure avant de manger.

Il existe de nombreuses formules possibles, à vous de trouver la vôtre.

Le traitement sera pris tous les jours à la même heure.

En plus de l'Abiratérone, vous prendrez de la Prednisolone (5 mg) chaque jour en mangeant.