

Réactions allergiques

Urticaire, démangeaisons, ...

- » Fénistil® : nombre de gouttes = poids de l'enfant, en kilos, max 20 gouttes 3x/j.




Moustiques

- » Avant 4 ans : huile essentielle de citronnelle.
- » Après 4 ans : lotion à adapter selon destination.



Piqûres d'insectes

- » Arnica crème® ou Fenigel®.



Tiques

- » Inspection quotidienne.
- » Pince à tiques.



Contacts

Consultation de Pédiatrie



064/27.64.78



du lundi au vendredi de 8h
à 12h30 et de 13h30 à 17h

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière



064/27.61.11



information@chu-tivoli.be



CHU Tivoli



www.chu-tivoli.be

ULB

REF : COMPEDIA016
Images / illustrations : Freepik, pixabay
et Pexels

E.R. : CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34

- 7100 La Louvière



CHU
Tivoli

Trousse pharmacie de voyage

Service de Pédiatrie



Gastroentérite aiguë

Pour la diarrhée :

- » Réhydrater avec ORS® sachets : ml après chaque diarrhée.
- » Limiter les diarrhées avec Tiorfix® sachets (< 9 kg = Tiorfix® baby 1 sachet 3x/jour, 9-15 kg= Tiorfix® baby 2 sachets 3x/jour).



Fièvre (plus de 38°)

- » Déshabiller l'enfant.
- » Paracétamol (Perdolan® - Dafalgan®) : suppositoire ou sirop, toutes les 6 heures = 1er choix !
- » ou Ibuprofène (Nurofen® - Perdophen®) : suppositoire ou sirop, toutes les 8 heures.
- » Alternier Paracétamol et Ibuprofène si nécessaire.



Nez bouché

- » Nettoyer au sérum physiologique 6x/jour.
- » Gouttes nasales, si nécessaire : Nesivine baby®, avant 2 ans, 3x/jour ou Nesivine pédiatrique®, après 2 ans, max 5 jours consécutifs.



Attention au soleil !

- » Pas d'exposition directe entre 11 et 16 heures.
- » Chapeau et lunettes solaires.
- » Crème solaire indice maximal 50+ pour enfants, à renouveler toutes les 2 heures.
- » Proposer régulièrement de l'eau.
- » Si brûlure : Biophadine® crème 2x/jour.

