

Contact

Consultation de pneumologie

Secrétariat-prise de rendez-vous :
064/27 61 14

Equipe infirmière de la consultation :
064/27 62 88



La fibroscopie bronchique

Service de Pneumologie



Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli
Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière
Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99
www.chu-tivoli.be

E.R.: CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Référence : COMPNEUMO002



DE QUOI S'AGIT-IL ?

La fibroscopie bronchique est un examen qui permet de visualiser le larynx, la trachée et les bronches à l'aide d'une fibre optique appelée endoscope. Cet examen permet également de réaliser des prélèvements bactériologiques (infection) ou de tissu bronchique.

Parfois il permet de déterminer l'origine d'un saignement ou encore d'enlever du matériel inhalé accidentellement (cacahuète, arête,...)

PRÉPARATION

- › Etre à jeun au minimum 4h avant l'examen, ne pas boire et ne pas manger.
- › Il est recommandé de ne pas fumer dès la veille de l'examen (vous tousserez ainsi beaucoup moins).
- › L'examen n'est pas douloureux mais peut donner de l'inconfort (toux, impression d'essoufflement, envie de vomir, ...).
- › La prise de médicaments anticoagulants (consulter la liste ci-dessous) doit être impérativement signalée au médecin afin d'être interrompue si nécessaire.

Sous forme de comprimé : Aspirine®, Asaflow®, Cardioaspirine®, Clopidogrel®, Plavix®, Xarelto®, Eliquis®, Sintrom®, Pradaxa®, Aggrenox®, Aspégic®, Sedergine®,...
Sous forme injectable : Clexane®, Innohep®, Fraxiparine®...

DÉROULEMENT

L'examen sera réalisé en consultation de pneumologie. Prévoyez de vous faire accompagner pour cet examen en prévision du retour à domicile.



Veillez vous inscrire à la perception avant de vous rendre à la consultation.

Durée : 30 minutes environ.

ÉTAPES PRINCIPALES

- › Installation confortable dans un fauteuil.
- › Anesthésie locale de la gorge, du nez et des bronches au moyen d'un spray anesthésiant.
- › Introduction de l'endoscope par la narine ou par la bouche.
- › Observation de l'ensemble des voies aériennes respiratoires.
- › En cas de biopsie: prélèvement d'un petit morceau de tissu au niveau de la lésion (parfois sous scanner).
- › Retrait de l'endoscope.
- › Fin de l'examen.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

- › La reprise de l'alimentation est possible 1h après l'examen. Testez avec quelques gorgées d'eau afin d'être sûr que l'anesthésie locale n'agisse plus.
- › Si des biopsies sont réalisées au cours de l'examen, des traces de sang peuvent apparaître dans vos expectorations
- › Une toux peut parfois apparaître après l'examen.
- › Si un lavage broncho-alvéolaire est réalisé durant l'examen, un pic de température dans les 24 à 48h qui suivent peut survenir.