

## Se préparer à l'intervention :

**24H**

La mise en place d'un cerclage du col de l'utérus nécessite une hospitalisation de **24 heures**.



Il vous est demandé d'être à jeun à partir de minuit. Il est possible de prendre votre traitement habituel avec un petit verre d'eau.

**10C**

Le jour même, présentez-vous accompagnée de la personne que vous souhaitez, à l'heure indiquée par le gynécologue, au service de grossesses à risque situé au 10C. Vous serez accueillie et prise en charge par une sage-femme.

Vous serez installée dans une chambre individuelle, munie d'un lit accompagnant, une salle de bain, une télévision, un téléphone fixe et un code wifi. Il vous sera demandé de prendre une douche préopératoire avec un savon spécial, d'ôter tout maquillage, vernis, bijoux et piercings. Une blouse ainsi qu'un bracelet d'identification vous seront donnés.



La sage-femme réalisera une prise de sang, des frottis vaginaux et une analyse d'urine.

## Comment avoir plus d'informations ?



N'hésitez pas à contacter votre gynécologue ou l'équipe des sage-femmes de la salle d'accouchement au **064/27.66.31**

## Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34  
7100 La Louvière



064/27.61.11



information@chu-tivoli.be



CHU Tivoli



[www.chu-tivoli.be](http://www.chu-tivoli.be)

ULB

REF : COMQAC 003

E.R. : CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34

- 7100 La Louvière



## Le cerclage du col de l'utérus

*Pôle mère - enfant*



## Le cerclage du col de l'utérus

Le col de l'utérus a un rôle essentiel pendant la grossesse, il est le verrou pour maintenir le bébé à l'intérieur de l'utérus.

Si votre col risque de s'ouvrir trop facilement, votre gynécologue vous proposera le placement d'un cerclage.

Le cerclage du col de l'utérus est une procédure chirurgicale qui consiste à resserrer le col de l'utérus à l'aide d'un fil non résorbable pour le maintenir fermé.

Le cerclage peut être placé :

- en prévention au premier trimestre de grossesse si vos antécédents le justifient.
- en urgence avant 24 semaines si votre col ne remplit plus son rôle de barrière empêchant bébé de sortir.



## Comment se passe l'intervention ?

Le cerclage du col est réalisé en salle d'opération au 3ème étage.

En salle d'opération, vous serez entourée d'un anesthésiste, de deux gynécologues et d'une infirmière de salle d'opération.

Une perfusion sera placée, puis l'anesthésiste procédera à une rachianesthésie : vous serez éveillée et consciente mais toute la zone en dessous du nombril sera endormie (abdomen et membres inférieurs).

Une fois l'anesthésie en place, vous serez installée en position gynécologique, l'intervention est pratiquée dans un environnement stérile, de grands draps seront placés sur vos jambes et votre ventre. Le gynécologue désinfectera ensuite votre périnée et placera un fil de suture par voie vaginale, autour du col qu'il nouera afin de le fermer et le consolider.

Une fois le cerclage en place, le gynécologue mettra la crème antibiotique vaginale en prévention d'un risque infectieux.

L'intervention dure environ 15 minutes puis vous serez surveillée pendant environ une heure en salle de réveil.

## Les suites et le retour à la maison

De retour dans votre chambre, la sage-femme veillera à votre confort et à vos paramètres vitaux. Si nécessaire, nous vous proposerons des antidouleurs. Dès que possible, la sage-femme vous accompagnera pour votre premier lever et apportera votre repas. Elle ôtera votre perfusion également à ce moment-là.

Dans certains cas, si votre groupe sanguin est négatif, vous recevrez une injection d'immunoglobulines préventive.

Vous pourrez rentrer à la maison dans les heures qui suivent l'intervention ou bien le lendemain en fonction des recommandations du gynécologue. Après le cerclage, le repos est nécessaire. Nous vous conseillons d'éviter les tâches fatigantes ainsi que de porter des charges lourdes.

Vous continuerez pendant 7 jours, à prendre le traitement local antibiotique à la maison. Le suivi médical de votre grossesse sera établi avec votre médecin.

Si vous présentez des pertes de liquide, de sang, ou de la température, contactez le gynécologue ou présentez-vous aux urgences de l'hôpital.

## À l'approche de l'accouchement

Autour de la 37ème semaine, quand le risque de prématurité s'écarte, votre médecin, retirera le fil du cerclage en consultation. Ceci n'est pas douloureux.

L'accouchement par voie naturelle est alors possible si toutes les conditions sont réunies.

Le fil du cerclage peut être ôté plus tôt si un accouchement prématuré est imminent.